

Purina

MASH EVERGREEN

Pastone da somministrare bagnato che unisce fibra, idratazione e nutrienti funzionali per sostenere il **benessere digestivo, l'equilibrio antiossidante e la qualità di cute e zoccoli** durante la stagione fredda. È possibile la somministrazione giornaliera anche in abbinamento ad altri alimenti.

SENZA MELASSO, ORZO, AVENA ED ERBA MEDICA

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Fibra digeribile e lieviti
Una combinazione di ingredienti selezionati per supportare l'equilibrio intestinale e il benessere digestivo del cavallo.

Da somministrare bagnato
Consente di aumentare il contenuto di acqua della razione, particolarmente utile durante i mesi più freddi.

Con beta-carotene, vitamina E e selenio organico
Nutrienti coinvolti nei fisiologici sistemi di protezione dallo stress ossidativo.

Con zinco e biotina
Nutrienti che contribuiscono al mantenimento di cute, mantello e zoccoli in buone condizioni.

Con 15% di fiocchi di mais e 5% di grassi grezzi
Contribuisce a soddisfare i fabbisogni energetici della razione anche durante i cambi di stagione e nei mesi più freddi.

Integrazione vitaminico-minerale bilanciata
Pratico da inserire nella razione quotidiana anche in associazione ad altri alimenti.

FORMA FISICA

Mix naturale di ingredienti fibrosi , lieviti ed ingredienti funzionali alla stagione fredda.

DATI ANALITICI* *(% sul t.q.)*

Proteine grezze	12%
Grassi grezzi	5%
Fibra grezza	16,8%

INTEGRAZIONE* *(per Kg)*

Vit. A	10.710 U.I.
Vit. D3	1.500 U.I.
Vit. E	348 mg
Vit. B12	0,018 mg
Beta-carotene	150 mg
Biotina	10 mg
Zinco	330 mg
Rame	55 mg
Manganese	48 mg
Ferro	298 mg
Calcio	0,62 mg
Selenio	2,13 mg

I nostri concessionari sono a vostra disposizione per il servizio di consulenza tecnica.

www.purinacavalli.it

Purina® and the Checkerboard Design are licensed trademarks of Société des Produits Nestlé S.A. - ©2026 Cargill, Incorporated. All Rights Reserved.

MASH
EVERGREEN

RAZIONE CONSIGLIATA

Pastone ideale per arricchire la razione quotidiana degli equini con un apporto bilanciato di nutrienti, con particolare attenzione alle fonti di fibra. Somministrare sempre bagnato da 1,5 a 2,5 kg al giorno, in sostituzione o in aggiunta ad altri mangimi complementari e in abbinamento ad almeno 1,2 kg di fieno/100 kg di peso vivo al giorno. Grazie alla sua preparazione in forma bagnata, consente di fornire una quota aggiuntiva di acqua insieme alla razione giornaliera. Una soluzione nutrizionale pensata per accompagnare l'alimentazione durante la stagione fredda.

FORMATO

Sacchi 20 kg

BIBLIOGRAFIA

As Sampled Vs. Dry Matter Results, Equi-Analytical Laboratory Service.
Castro Herrera et al. (2008). Effect of zinc methionine on the equine hoof: an evaluation by environmental scanning electron microscopy.
Finno C.J., McKenzie E.C. (2025). Vitamin E and Selenium-Related Manifestations of Muscle Disease.
Ganda et al. (2023). Saccharomyces cerevisiae fermentation product improves robustness of equine gut microbiome upon stress.
Garcia E.I.C. et al. (2022). Oxidative stress in horses and dietary supplementation of vitamins E, C and beta-carotene.
Geyer H., Schulze J. (1994). The long-term influence of biotin supplementation on hoof horn quality in horses.
Greiwe-Crandell K.M., Kronfeld D.S., Sklan D. (1989). Vitamin A and beta-carotene supplementation in horses fed forages of varying carotene content. Journal of Nutrition.
Horse Hoof Supplements: Biotin, Zinc, and What the Research Actually Says.
Kentucky Equine Research. Biotin Basics.
Kentucky Equine Research. Hay Versus Pasture Grass for Horses: Comparing Forage Sources.
Kentucky Equine Research. Hoof Support: Biotin Supplementation in Horses.
Kentucky Equine Research. Pass the Carrots: Beta-Carotene for Horses.
Kentucky Equine Research. Yeast Supplementation and Fiber Digestion in Horses.
Mendez Medina et al. (2022). Influence of Dietary Selenium on the Oxidative Stress in Horses.
Montgomery J.B., Wichtel J.J. et al. (2012). Effects of selenium source on measures of selenium status and immune function in horses.
National Research Council (NRC). Nutrient Requirements of Horses (2007).
Owen et al. (2022). Elevated dietary selenium rescues mitochondrial capacity impairment induced by decreased vitamin E intake in young exercising horses.
Perricone V. et al. (2022). The Role of Yeast Saccharomyces cerevisiae in Supporting Gut Health in Horses. Animals, 12, 3475.
Pitel M.O. et al. (2020). Influence of specific management practices on blood selenium, vitamin E, and beta-carotene concentrations in horses.
Reilly J.D. et al. (1998). Effect of supplementary dietary biotin on hoof growth in ponies.
Review scientifiche sulla biotina, sintesi della cheratina e qualità dello zoccolo nel cavallo.
Richardson S.M., Siciliano P.D., Engle T.E. et al. (2006). Effect of selenium supplementation and source on the selenium status of horses.
Selenium and Vitamin E for Horses: Antioxidant Nutrients.
Williams C.A., Ralston S.L. Winter Feeding for Horses.

*Le caratteristiche riportate potrebbero subire lievi variazioni. Si raccomanda di consultare le informazioni aggiornate presenti sulle etichette al momento dell'acquisto.